

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-7-76204158

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. : (88) 36.24.87

C.P.P.A.P. n° 523 AD

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Bulletin n° 99

29 juillet 1976

GRANDES CULTURES

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Le temps pluvieux et humide qui intéresse nos régions depuis le 18 juillet est favorable au développement du mildiou. Sur les variétés sensibles à la maladie, des premiers foyers peuvent s'observer dans de nombreuses parcelles. Ces foyers sont plus importants en cultures d'altitude où la pluviométrie a été généralement plus abondante. Sur les variétés hâtives ou mi-hâtives (Sirtema par exemple) qui sont ou qui arrivent à maturité, aucun traitement mildiou n'est à effectuer. Par contre, procéder au défanage si la récolte n'est envisagée que dans 8 à 10 jours. Sur les variétés tardives, il est vivement recommandé de renouveler le traitement fongicide dans les meilleurs délais.

- HOUBLON -

MILDIOU

Le mildiou du houblon trouve des conditions climatiques idéales à son développement depuis le début de la troisième décennie de ce mois. D'autre part, le houblon est actuellement à un stade de grande sensibilité à la maladie (début conaison).

Il y a donc lieu d'être très prudent. Un nouveau traitement devra être réalisé dès que possible. Bien mouiller l'ensemble de la végétation.

OIDIUM

Les risques persistent. Dans les parcelles contaminées l'an dernier, profiter du traitement contre le mildiou pour opérer en traitement mixte.

ARAIGNEES ROUGES

Quelques houblonnières insuffisamment protégées, présentent des attaques assez sévères d'araignées rouges. Nous rappelons aux houblonniers la nécessité de suivre attentivement le développement de ces acariens de façon à intervenir avant de voir de nombreuses feuilles se décolorer.

CULTURES MARAICHÈRES

- CELERI -

SEPTORIOSE

Les premières taches de septoriose du céleri sur les feuilles commencent à apparaître. Renouveler le traitement dans les premiers jours de la semaine prochaine où dès l'apparition des premières taches.

- CHOUX -

PUCERONS

Le puceron cendré est très actif sur choux, notamment sur choux à choucroute. L'on note par endroit de véritables pullulations.

Pour le traitement donner sa préférence à un produit à action systémique. Ajouter un mouillant à la bouillie.

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Le traitement insecticide serait à renouveler avant le 3 août. Pour les poireaux proches de la récolte, choisir l'insecticide en fonction de son délai d'emploi avant récolte, délai qui doit être scrupuleusement respecté.

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Le vol des papillons de la deuxième génération est pratiquement terminé. Il a été court et bien groupé.

Il n'y a donc pas lieu d'effectuer un deuxième traitement dans les parcelles correctement protégées.

Nous signalons cependant que les attaques de cette deuxième génération sont fortes dans certaines parcelles négligées (parfois jusqu'à 5 pénétrations en moyenne par grappe). Dans ces parcelles un traitement curatif pourrait encore être envisagé bien que la période d'intervention est maintenant tardive.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER